

?????

????? ?????

????? ?????? ??????????

??????

????? ??? ????????



تعریف

ورم ملتحمه (کونژنکتیویت) پرخونی عروق ملتحمه با ترشح آبکی یا چرکی است که شایع ترین علت قرمزی چشم می باشد.

تقسیم بندی

کونژنکتیویت عفونی شایع شامل کونژنکتیویت ویروسی و باکتریایی است.

ویروس ها شایعترین علت ورم ملتحمه عفونی هستند. کونژنکتیویت ویروسی می تواند همراه با تب و گلودرد باشد. ممکن است در این حالت بیماری یکطرفه یا دو طرفه باشد. یک نوع آن (ناشی از آدنوویروس) به صورت اپیدمی یا همه گیر بروز می کند و شروع آن معمولا از یک چشم است. قرمزی، درد و اشکریزش و پس از 5-14 روز ترس از نور ایجاد می شود. این نوع کونژکتیویت حداکثر 3-4 هفته ادامه می یابد. در حال حاضر درمان خاصی ندارد. کمپرس سرد نشانه ها را کاهش می دهد. در صورت بروز کونژکتیویت باکتریال ثانویه باید ضد باکتری تجویز شود.

باید توجه داشته باشید که کونژنکتیویت ویروسی بسیار مسری است و حتی فرد نیاز به جدا شدن از افراد دیگر دارد.

ورم ملتحمه باکتریایی با ترشح چرکی زیادی از چشم ها همراه است. به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد. درمان به موقع سیر بیماری را کوتاه می کند. در بعضی موارد عدم درمان آسیب شدیدی به قرنیه وارد می کند.

علائم بالینی کونژنکتیویت

قرمزی چشم، ترشح و پوسته های چرکی، ناراحتی و احساس جسم خارجی، به هم چسبیدن لبه پلکها به علت وجود ترشحات، حساسیت خفیف به نور، سوزش چشم، تورم پلکها

عوارض

گاهی بیماری با زخمهای حاشیه قرنیه، لبه پلکها، التهاب پلکها، خشکی سطح چشم و مزمن شدن همراه می شود.

درمان

* جهت کنترل بیماری از قطره آنتی بیوتیک نظیر قطره چشمی کلرامفنیکل 1% می توان استفاده کرد.

* درمان ویژه برای نوع باکتریایی به شناسایی عامل میکروبی بستگی دارد.

* استفاده از پماد آنتی بیوتیک قبل از خواب چسبندگی صبحگاهی پلک ها را کاهش خواهد داد.

*** قطره کلرامفنیکل را در صورت امکان در یخچال نگهداری کنید و پس از 21 روز از زمان بازشدن قطره آن را دور بیندازید.**

*** فضای منزل حتما دارای تهویه مناسبی باشد تا از تجمع ویروس در فضا جلوگیری شود.**

*** چشم ها را داخل یا خارج از منزل به هیچ وجه نبندید تا از تجمع ترشحات جلوگیری شود.**

*** این بیماری محدودیت مصرف غذایی ندارد.**

*** عینک های آفتابی در کاهش حساسیت به نور کمک کننده هستند.**

توصیه های بهداشتی

* از قطره و پماد چشمی تجویز شده توسط پزشک استفاده کنید. مصرف آنها

در کوئزکتیویت و پروسی جهت جلوگیری از آلوده شدن چشم ها به میکروب دیگر می باشد و در سیر بیماری تاثیری ندارد.

* مدت زمان دوره بیماری در نوع و پروسی در افراد مختلف متفاوت است و از 10 روز تا یک ماه و در بعضی موارد چندین ماه متغیر است.

* ورم ملتحمه عفونی کاملا واگیردار است و لازم است فرد مبتلا پس از هر بار دست زدن به چشم ها و یا ترشحات آن حتما دستهای خود را به مدت 30 ثانیه با آب و صابون شستشو دهد و وسایل شخصی وی (حوله، ملحفه و ...) از سایر افراد جدا باشد.

*** یکبار ابتلا به بیماری نوع و پروسی و یا میکروبی آن سبب ایمن شدن بدن نمی شود و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی بالا احتمال ابتلا مجدد وجود دارد.**

*** نوع و پروسی این بیماری بسیار مسری می باشد لذا توصیه می شود نکات بهداشتی را رعایت فرمایید تا از سرایت به چشم دیگر و یا اطرافیان جلوگیری نمایید.**